

CONAST

Servizi Consulenze Formazione

SINTESI SU GESTIONE POSITIVITÀ E CONTATTI PER COVID-19

Aggiornamento 01.01.2023

Gestione dei casi positivi dal 01.01.2023

Riscontro di positività	Durata dell'isolamento domiciliare	Riammissione in collettività
Test molecolare o antigenico con risultato positivo.	<u>Senza test negativo</u> di fine isolamento: <ul style="list-style-type: none">Asintomatici: isolamento di almeno 5 giorni dall'esecuzione del testSintomatici: isolamento di almeno 5 giorni dall'esecuzione del test o dalla comparsa dei sintomi e dopo 2 giorni dalla cessazione dei sintomi	<u>Senza test negativo</u> di fine isolamento: Uso mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'inizio dei sintomi o dal primo test positivo. Si raccomanda di evitare luoghi affollati e il contatto con persone ad alto rischio
A seguito di test positivo è necessario l'isolamento domiciliare	<u>Con test negativo</u> di fine isolamento: <ul style="list-style-type: none">Asintomatici: fine isolamento anche per un periodo inferiore ai 5 giorniSintomatici: da effettuare test dopo cessazione sintomi da almeno 2 giorni	<u>Con test negativo</u> di fine isolamento: Nessuna ulteriore precauzione
	<u>Particolarità:</u> <ul style="list-style-type: none">Immunodepressi: isolamento per almeno 5 giorni con fine isolamento a seguito di test con esito negativoOperatori sanitari: fine isolamento dopo essere asintomatici da almeno 2 giorni e test con esito negativoPositivi a lungo termine: interruzione dell'isolamento dopo 14 giorni anche senza aver effettuato test con esito negativo	Come sopra

Gestione dei contatti stretti di caso positivo dal 01.01.2023

- Si applica il regime di auto sorveglianza *fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto* stretto con un soggetto positivo
- Durante il periodo di auto sorveglianza è obbligatorio di *indossare mascherine di tipo FFP2*, al chiuso o in presenza di assembramenti *per almeno 5 giorni* alla data dell'ultimo contatto stretto con un soggetto positivo
- Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare e contatto con il medico o il pediatra di famiglia
- Gli operatori sanitari devono eseguire *giornalmente* un test antigenico o molecolare *fino al quinto giorno dall'ultimo contatto* con un caso confermato.